| | | | |
|---|---|---|---|
| Outil | BDI-13 | | |
| Premier évaluateur | Jonathan Burnay | Date | 07-12-21 |
| Second évaluateur | | Date | |

| | Propriétés | Critères de cotation | Comprendre | Détecter | Diagnostiquer | Évolution du patient | Cotation de BDI-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preuves de validité | Preuves de validité de la structure interne | Présence d'une CFA dont les critères sont corrects[1] (1)<br>Présence d'une EFA (0,5)<br>Pas d'EFA ou de CFA (0)<br>N/A | Vérifie la présence des dimensions attendues et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente | Vérifie la présence des dimensions supposément mesurées et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente | Vérifie la présence des dimensions nécessaires au diagnostic et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente | Vérifie la présence des dimensions qui mesure le changement dans un construit et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente | Aucun |
| | Preuves de validité théorique et de contenu | Présence (1)<br>Absence (0) | Assure que l'outil est construit sur une définition précise et qu'il permet l'exploration de tous les éléments d'un modèle théorique | Assure que l'outil est construit sur une définition précise ou un modèle théorique et que tous les symptômes sont représentés | Assure que l'outil est construit sur une définition précise ou un modèle théorique et que tous les symptômes sont représentés | Assure que l'outil est construit sur une définition précise du construit dont on souhaite mesurer le changement | Absence |
| | Relation avec d'autres variables (Concourante, convergente ou divergente) | Présence (1)<br>Absence (0) | Assure que le construit mesuré corrèle<br>1) avec un autre outil, qui évalue le même construit (concourants)<br>2) avec des construits reliés positivement (convergent)<br>3) avec des construits reliés négativement (divergent)<br>à un niveau théorique ou épidémiologique | Assure que le construit mesuré corrèle<br>1) avec beaucoup d'outils diagnostiques (concourants)<br>2) avec des construits reliés positivement (convergent)<br>3) avec des construits reliés négativement (divergent)<br>à un niveau théorique ou épidémiologique | Assure que le construit mesuré<br>1) pourrait être obtenu avec un autre outil diagnostique (concourante)<br>2) corrèle avec des construits positivement liés (convergente)<br>3) corrèle avec des construits négativement liés (divergente)<br>À un niveau théorique ou épidémiologique | Assure que le construit mesuré corrèle<br>1) Avec un autre outil, qui évalue le même construit (concourante)<br>2) Avec des construits positivement liés (convergente)<br>3) Avec des construits négativement liés (divergente)<br>À un niveau théorique ou épidémiologique | Présence |
| | Preuves de validité prédictive | Présence (1)<br>Absence (0) | Assure que le construit reflète les difficultés du patient dans la vraie vie | Assure que le construit mesuré prédit au moins un comportement ou une conséquence dans la vraie vie qui appuie la pertinence du traitement thérapeutique | Assure que le construit mesuré prédit au moins un comportement ou une conséquence dans la vraie vie qui appuie la pertinence du traitement thérapeutique | Assure que le construit reflète des changements dans la vraie vie après la thérapie | Absence |
| | Preuves de validité discriminante – Sensibilité | Présence (1)<br>Absence (0) | Non pertinent | Assure que l'outil détecte autant d'individus possédant le construit évalué que possible | Assure que l'outil détecte autant d'individus possédant le construit évalué que possible | Non pertinent | Absence |
| | Preuves de validité discriminante – Spécificité | Présence (1)<br>Absence (0) | Non pertinent | Assure que l'outil exclut autant d'individus possédant le construit évalué que possible | Assure que l'outil exclut autant d'individus possédant le construit évalué que possible | Non pertinent | Absence |
| Preuves de fidélité | Sensibilité au changement | Présence (1)<br>Absence (0) | Permets de détecter les changements attendus dans le temps | Permets de détecter les changements dans le temps | Permets de détecter les changements dans le temps | Permets de détecter les changements dans le temps | Absence |
| | Fidélité test-retest | Sur une population générale<br>≥ .90 (1)<br>≥ .80 (0,66)<br>≥ .70 (0,33)<br>< .70 (0) | Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permets de calculer l'erreur standard de mesure et de connaître la précision de l'outil. | Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permets de calculer l'erreur standard de mesure et l'intervalle de confiance autour du score. | Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permets de calculer l'erreur standard de mesure et de connaître la précision de l'outil. | Essentiel pour affirmer que les changements de score peuvent être attribués à la thérapie | Absence |
| | Fidélité interjuge | ≥ .90 (1)<br>≥ .80 (0,66)<br>≥ .70 (0,33)<br>< .70 (0)<br>NA | Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre | Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre | Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre | Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre | Non-applicable |
| | Consistance interne | ≥ .90 (1)<br>≥ .80 (0,66)<br>≥ .70 (0,33)<br>< .70 (0) | Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil | Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil | Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil | Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil | Absence |
| Score | Distribution des données | Normal (1)<br>Corrigé/Percentile (1)<br>Non-normal and non-corrigé (0) | Aide à interpréter les résultats | Essentiel pour juger de la présence probable d'une ou plusieurs dimensions | Essentiel pour juger de la présence probable d'une ou plusieurs dimensions | Aide à interpréter les résultats | Inconnue |
| | Erreur standard de mesure | Calculable (1)<br>Non calculable (0) | Permets de déterminer la précision de l'outil de mesure | Permets de déterminer la précision de l'outil de mesure | Permets de déterminer la précision de l'outil de mesure | Permets de déterminer la précision de l'outil de mesure | Non-calculable |
| Score de BDI-13 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | |

[1] $\chi^2/dl < 5$, RMSEA < 0,08, GFI > 0,90, AGFI > 0,85, SRMR < 0,05, CN > 200, NFI > 0,90, NNFI > 0,95, CFI > 0,95

Essentiel

Important

Secondaire


Références

10.1037/h0081254

Collet, L., & Cottraux, J. (1986). Inventaire abrégé de la dépression de Beck (13 items): Étude de la validité concurrente avec les échelles de Hamilton et de ralentissement de Widlöcher