

Outil	VB-MAPP		
Premier évaluateur	Marion Balla	Date	12/11/2024
Second évaluateur		Date	

Propriétés	Critères de cotation	Comprendre	Évolution du patient	Détecter	Diagnostiquer	Cotation de VB-MAPP
Preuves de validité interne	Présence d'une CFA dont les critères sont corrects (1) Présence d'une EFA (0,5) Pas d'EFA ou de CFA (0) N/A	Vérifie la présence des dimensions attendues et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente	Vérifie la présence des dimensions qui mesure le changement dans un construit et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente	Vérifie la présence des dimensions supposément mesurées et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente	Vérifie la présence des dimensions nécessaires au diagnostic et que l'addition de plusieurs items ensembles représente une dimension cohérente	Aucun
	Présence (1) Absence (0)	Assure que l'outil est construit sur une définition précise et qu'il permet l'exploration de tous les éléments d'un modèle théorique	Assure que l'outil est construit sur une définition précise du construit dont on souhaite mesurer le changement	Assure que l'outil est construit sur une définition précise ou un modèle théorique et que tous les symptômes sont représentés	Assure que l'outil est construit sur une définition précise ou un modèle théorique et que tous les symptômes sont représentés	Présence
	Présence (1) Absence (0)	Assure que le construit mesuré corrèle 1) avec un autre outil, qui évalue le même construit (concourants) 2) avec des construits reliés positivement (convergent) 3) avec des construits reliés négativement (divergent) à un niveau théorique ou épidémiologique	Assure que le construit mesuré corrèle 1) Avec un autre outil, qui évalue le même construit (concourante) 2) Avec des construits positivement liés (convergente) 3) Avec des construits négativement liés (divergente) À un niveau théorique ou épidémiologique	Assure que le construit mesuré corrèle 1) Avec beaucoup d'outils diagnostiques (concourants) 2) avec des construits reliés positivement (convergent) 3) avec des construits reliés négativement (divergent) à un niveau théorique ou épidémiologique	Assure que le construit mesuré 1) pourrait être obtenu avec un autre outil diagnostique (concourante) 2) corrèle avec des construits positivement liés (convergente) 3) corrèle avec des construits négativement liés (divergente) À un niveau théorique ou épidémiologique	Absence
	Présence (1) Absence (0)	Assure que le construit reflète les difficultés du patient dans la vraie vie	Assure que le construit reflète des changements dans la vraie vie après la thérapie	Assure que le construit mesuré prédit au moins un comportement ou une conséquence dans la vraie vie qui appuie la pertinence du traitement thérapeutique	Assure que le construit mesuré prédit au moins un comportement ou une conséquence dans la vraie vie qui appuie la pertinence du traitement thérapeutique	Absence
	Présence (1) Absence (0)	Non pertinent	Non pertinent	Assure que l'outil détecte autant d'individus possédant le construit évalué que possible	Assure que l'outil détecte autant d'individus possédant le construit évalué que possible	Absence
	Présence (1) Absence (0)	Non pertinent	Non pertinent	Assure que l'outil exclut autant d'individus possédant le construit évalué que possible	Assure que l'outil exclut autant d'individus possédant le construit évalué que possible	Absence
Sensibilité au changement	Présence (1) Absence (0)	Permet de détecter les changements attendus dans le temps	Permet de détecter les changements dans le temps	Permet de détecter les changements dans le temps	Permet de détecter les changements dans le temps	Absence
Fidélité test-retest	<u>Sur une population générale</u> ≥ .90 (1) ≥ .80 (0,66) ≥ .70 (0,33) < .70 (0)	Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permet de calculer l'erreur standard de mesure et de connaître la précision de l'outil.	Essentiel pour affirmer que les changements de score peuvent être attribués à la thérapie	Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permet de calculer l'erreur standard de mesure et l'intervalle de confiance autour du score.	Assure que sans intervention, le score reste similaire. Permet de calculer l'erreur standard de mesure et de connaître la précision de l'outil.	Absence
	≥ .90 (1) ≥ .80 (0,66) ≥ .70 (0,33) < .70 (0) NA	Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre	Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre	Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre	Assure que le score est le même d'un clinicien à l'autre	Absence
	≥ .90 (1) ≥ .80 (0,66) ≥ .70 (0,33) < .70 (0)	Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil	Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil	Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil	Assure que tous les items participent de façon cohérente au score de l'outil	Absence
Distribution des données	Normal (1) Corrigé/Percentile (1) Non-normal and non-corrigé (0)	Aide à interpréter les résultats	Aide à interpréter les résultats	Essentiel pour juger de la présence probable d'une ou plusieurs dimensions	Essentiel pour juger de la présence probable d'une ou plusieurs dimensions	Inconnue
Erreur standard de mesure	Calculable (1) Non calculable (0)	Permet de déterminer la précision de l'outil de mesure	Permet de déterminer la précision de l'outil de mesure	Permet de déterminer la précision de l'outil de mesure	Permet de déterminer la précision de l'outil de mesure	Non-calculable
Score de VB-MAPP		2	0	0	1	

1 $\chi^2/df < 5$, RMSEA < 0,08, GFI > 0,90, AGFI > 0,85, SRMR < 0,05, CN > 200, NFI > 0,90, NNFI > 0,95, CFI > 0,95

- Essentiel
- Important
- Secondaire

Références

Sundberg, M. (2014). VB-MAPP: Evaluation du comportement verbal et programme d'intervention. DeBoeck Supérieur.